

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1572

Marbocyl P 20mg tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

Marbofloxacin

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 LURE

Francija

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.,

13-14 Kosynierow Gdynskich st.,

66-400 Gorzów Wlkp.,

Polija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Marbocyl P 20mg tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

Marbofloxacin

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 tablete satur:

Marboflokscācīn 20,0 mg

Papildvielas 280, mg

4. INDIKĀCIJA(AS)

Suņiem: Marboflokscācīns ir indicēts:

- ādas un mīksto audu infekciju ārstēšanai, kuras ierosina pret marboflokscācīnu jutīgi ierosinātāji.

- urīntrakta infekciju (UTI), arī prostatīta, ārstēšanai, kuras ierosina pret marboflokscācīnu jutīgi ierosinātāji.

- respiratorā trakta infekciju ārstēšanai, kuras ierosina pret marboflokscācīnu jutīgi ierosinātāji.

Kaķiem: Marboflokscācīns ir indicēts ādas un mīksto audu infekciju (brūces, abscesi, flegmonas) un augšējo elpošanas ceļu infekciju ārstēšanai, kuras ierosina pret marboflokscācīnu jutīgi ierosinātāji.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot augošiem suņiem jaunākiem par 8 līdz 18 mēnešu vecumu, atkarībā no šķirnes lieluma.

Nelietot vīriešu kārtas vaislas suņiem, jo nav pieejami dati par ietekmi uz auglību vīriešu kārtas suņiem.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot vieglu blakusiedarbību, tādu kā vemšana, alerģiska reakcija, locītavu sāpes, mīksts konsistences fečes, slāpes vai īslaicīga aktivitātes paaugstināšanās. Pēc ārstēšanas šīs pazīmes pazūd.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Vispārīgā deva suņiem un kaķiem ir 2 mg/kg ķermeņa svara vienu reizi dienā. Tabletes iekšķīgai lietošanai tieši mutē vai kopā ar barību.

Devas:

Kaķiem un maza auguma suņiem:– 1/4 tabletes uz 2,5 kg ķermeņa svara.

Vidēja auguma suņiem:– 1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara.

Ārstēšanas ilgums:

Kaķiem: ādas un mīksto audu infekciju un augšējo elpošanas ceļu infekciju gadījumā ārstēšanas ilgums ir 3-5 dienas.

Suņiem: ādas un mīksto audu infekciju gadījumā ārstēšanas ilgums ne mazāk kā 5 dienas. Atkarībā no slimības gaitas to var pagarināt līdz 40 dienām.

Urīntrakta infekciju gadījumā ārstēšanas ilgums ne mazāk kā 10 dienas. Atkarībā no slimības gaitas to var pagarināt līdz 28 dienām.

Elpošanas trakta infekciju gadījumā ārstēšanas ilgums ne mazāk kā 7 dienas, un atkarībā no slimības gaitas to var pagarināt līdz 21 dienai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Neuzglabāt temperatūrā virs 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09.07.2010

15. CITA INFORMĀCIJA

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.
Recepšu veterinārās zāles